

## DETERMINANTS ET FACTEURS DE RISQUE

### Les femmes moins souvent consommatrices que les hommes

Selon le Baromètre Santé 2000 du CFES, globalement, il n'existe pas de différence de consommation d'alcool entre la France et le Poitou-Charentes. Les hommes sont plus souvent consommateurs de boissons alcoolisées que les femmes : 30 % des hommes ont déclaré avoir consommé des boissons alcoolisées tous les jours au cours des 12 derniers mois contre 13 % des femmes. Le type de consommateurs le plus fréquent est constitué par les consommateurs hebdomadaires : 35 % des femmes et 45 % des hommes.

### Des situations différentes selon l'âge

C'est dans la classe d'âge 55-75 ans que la proportion de buveurs quotidiens est la plus importante (67 %). Dans cette classe d'âge et celle des 35-44 ans dans laquelle la proportion de buveurs quotidien est de 37 %, les Picto-Charentais sont en situation défavorable par rapport à la moyenne nationale. De même, les femmes de la région âgées entre 35 et 44 ans sont plus fréquemment consommatrices quotidiennes que les françaises du même âge (27 % contre 15 %).

En ce qui concerne les consommations du week-end, les jeunes ont des consommations excessives plus fréquemment que leurs aînés : parmi les buveurs d'alcool hebdomadaires et quotidiens, les hommes âgés de 55 à 75 ans sont un peu plus de 12 % à avoir consommé plus de 5 verres d'alcool le samedi soir précédent tandis que la proportion est de 27 % chez les 12-19 ans.

Les risques de dépendance à l'alcool repérés par un test spécifique (test DETA Cf. Glossaire), concerneraient environ 4 % des femmes et 11 % des hommes de la région (ce qui correspond aux résultats obtenus dans l'enquête Alcool présentée ci-contre).

Plus de 10 % des hommes et 5 % des femmes à risque de dépendance à l'alcool

## Alcool


### Part des décès liés à l'alcool en Poitou-Charentes selon le sexe en 1998-2000 et évolution 1990-2000 (en %)

		France	Poitou-Charentes	Évolution 1990-2000 du nbre de décès en PC
Cirrhose du foie	H	2,2	2,1	8,2
	F	1	0,8	3,2
Cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures	H	3,5	2,9	-28,1
	F	0,6	0,5	28,1
Psychose alcoolique et alcoolisme	H	0,8	0,7	24,1
	F	0,2	0,2	-6,7
TOTAL	H	6,5	5,7	-11,7
	F	1,8	1,5	9,2

Source : INSERM Cépi-Dc

Réalisation ORSPEC

### Répartition des types de consommateurs d'alcool par sexe en Poitou-Charentes (en %)



Source : Baromètre Santé 2000 CFES

Réalisation ORSPEC

Pour en savoir plus :

1. NOURY U. Enquête alcool en Poitou-Charentes : étude de l'alcoolisation dans les populations en situation de soins. —Rapport de stage, DRASS Poitou-Charentes, 2002, 69 p. + annexes.
2. Prévalence de l'alcoolisation parmi la clientèle des médecins généralistes de Poitou-Charentes en 2000. ORS Poitou-Charentes, rapport n° 84, novembre 2002, 34 p + annexes.
3. Baromètre Santé Poitou-Charentes 2000. Enquête auprès des 12-75 ans. 10 fiches thématiques. ORSPEC, janvier 2003.

### Une évolution défavorable du nombre de décès féminins liés à l'alcool

Globalement la part des décès attribuables à la consommation d'alcool est moins importante dans la région qu'au niveau national. L'évolution du nombre de décès liés à l'alcool entre 1990 et 2000 est favorable pour les hommes mais défavorable pour les femmes.

En gras : test statistique France/Région significatif (au risque de 5 %)

### L'enquête Alcool menée un jour donné auprès des usagers du système de soins

Cette enquête nationale a été initiée en 2000 par la DREES et la DGS, et réalisée par les DRASS en milieu hospitalier et les ORS en médecine générale. L'objectif était d'estimer la prévalence des problèmes d'alcool parmi les personnes ayant recours au système de soins un jour donné. Ce risque était repéré à partir de la combinaison de trois outils : les réponses recueillies au questionnaire DETA (Cf. Glossaire) relatives à la perception du patient de sa consommation d'alcool, les réponses du patient au questionnaire AUDIT (Cf. Glossaire), et l'avis du médecin traitant.

Ainsi, en médecine générale, un profil à risque sans dépendance vis-à-vis de l'alcool concerne 21 % des hommes et 4 % des femmes, tandis que le profil à risque avec dépendance à l'alcool concerne 11 % des hommes et 4 % des femmes. Le Poitou-Charentes se situe parmi les régions françaises qui ont une proportion de profils à risque avec dépendance plus élevée que la moyenne nationale, et en particulier pour les hommes. En milieu hospitalier, le profil à risque sans dépendance concerne 22 % des hommes et 5 % des femmes, et le profil à risque avec dépendance 12 % des hommes et 4 % des femmes, sans différence significative avec la France.